

POKYNY PRO SESTRY U PACIENTŮ LÉČENÝCH TROMBOLÝZOU

Pracoviště:

A/ Jedna sestra JIP nebo pohotovostní ambulantní sestra odchází akutně s lékařem a se sanitárkou na pracoviště CT (s sebou žádanky CT, 2 flexily + potřebné k zavedení a + viz.níže)

- zde provede měření TK, TF
- provede odběr těchto laboratoří – vše statim – glukosa, urea, kreatinin, bilirubin, Na, K, Cl, celková bílkovina, albumin, AST, ALT, GMT, HBD, CK, CKMB, AMS, krevní obraz, koagulace (Q, INR a aPTT, F), KS (žádanky nadepsány – pacient k trombolýze, prosím urgentně)
- objednání jedné mražené plazmy a čerstvé krve

B/ Sanitárka odnáší odebrané krve, pokud to nebude možné takto zajistit (např. nebude-li sanitárka k dispozici), krve musí odnést přivolaný ustavní sanitář nebo eventuelně sestra přímo z CT do příslušných laboratoří. Sestra na CT zavolá sanitáře k odvezení pacienta. Sestra uvědomí pracoviště biochemie a hematologie, že zasílá vzorek k urgentnímu zpracování.

C/ Pokud lékař rozhodne o aplikaci rt-PA připraví infúzi tímto způsobem – ředění 1 mg na 1 ml (použije se přibalené lahvičky vody pro inj.). V lahvičce s rt-PA je podtlak, proto se vpichuje převáděcí kanyla nejprve do lahvičky s vodou. Takto připravený roztok se nesmí dále ředit a mísit s jinými léky. Dávkování – 0,9 mg/kg, 10% úvodní bolus i.v., zbytek v infúzi trvající 60 minut infúzní pumpou.

D/ Pacient bude hospitalizovaný na JIP, monitor bude nastaven měřit TK po nejdéle 15 minutách v první hodině, v dalších hodinách po nejdéle 30 minutách.

E/ Nutno pátrat po možných komplikacích – krvácení v místě vpichu, z dásní, GIT, urogenitální, atd. – ihned vše hlásí lékaři.

F/ Pacient nesmí být katetrizován do nejméně 30 minut po skončení infúze. V prvních 24 hodinách nesmí být zavedena NGS, centr.žilní katétr a nesmí být provedena arteriální punkce.

G/ Zákaz aplikace intramuskulárních injekcí v průběhu a následně asi jednu hodinu po podání rt-PA – v případě potřeby dle koagulačních parametrů.

H/ Po podání rt-PA v dalších 24 hodinách odběry á 6 hodin – aPTT , TT, F, Q, INR, KO, za 24 hodin biochemie, vše statim.

I/ Kontrolní CT mozku musí být provedeno v rozmezí 22-36 hodin od léčby (požadavek SITS registru).